

இரு வயதான நோயாளி கால்-கை வலிப்பு நோயால் பாதிக்கப்படும்போது நீங்கள் இந்த விஷயங்களைச் செய்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும்⁷

வலிப்புத்தாக்கம் முழுமையாக முடிந்து, நபர் மீண்டும் முழுமையாக விழிப்புடன் இருக்கும் வரை எதையும் வலுக்கட்டாயமாக வாயில் கொடுக்க வேண்டாம். இதில் மருந்துகள் அல்லது திரவங்களும் அடங்கும்.

தலை அசைவுகளைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டாம், ஏனெனில் இது தலைகளுக்கு சேதக்தை ஏற்படுத்தும். வயதான நோயாளிகளின் எலும்புகள் உடையக்கூடியதாக இருப்பதால் இது எலும்பு முறிவுகளையும் ஏற்படுத்தலாம்.



கால்-கை வலிப்பு உள்ள பெரும்பாலான வயதான நோயாளிகள் பொருத்தமான சிகிச்சையுடன் வலிப்புத்தாக்கங்களை நன்கு கட்டுப்படுத்த முடியும்.^{4,8}

கால்-கை வலிப்புடன் வாழும் வயதான நோயாளிகளில் 62% வரை இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வலிப்புத்தாக்கமின்றி மாறலாம்.⁹

References:

1. Liu S, Yu W, Lü Y. The causes of new-onset epilepsy and seizures in the elderly. *Neuropsychiatr Dis Treat*. 2016 Jun 17;12:1425-34.
2. Amudhan S, Gururaj G, Satishchandra P. Epilepsy in India I: Epidemiology and public health. *Ann Indian Acad Neurol*. 2015 Jul-Sep;18(3):263-77.
3. Schachter SC. Seizure triggers [Internet] [Updated 2022]. Available at: <https://www.epilepsy.com/what-is-epilepsy/seizure-triggers/#What-are-some-commonly-reported-triggers>. Accessed on Oct 20, 2022.
4. Epilepsy & seizure in older adults [Internet] [Sep 13, 2021]. Available at: <https://www.cdc.gov/epilepsy/communications/features/olderadults.htm>. Accessed on Jan 13, 2023.
5. Advice for patients who have epilepsy and/or seizures. Available at: https://www.stgeorges.nhs.uk/wp-content/uploads/2015/06/AMC_SAE_01.pdf. Accessed on Oct 20, 2022.
6. Epilepsy - first aid and safety [Internet] [Updated Mar 11, 2020]. Available at: <https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditions-and-treatments/epilepsy-first-aid-and-safety#epilepsy-and-your-safety>. Accessed on Jan 13, 2023.
7. Seizures and seniors [Internet]. Available at: <https://epilepsychicago.org/what-is-epilepsy/first-aid/first-aid-for-seniors/>. Accessed on Feb 10, 2023.
8. Epilepsy. Available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy>. Accessed Oct 20, 2022.
9. Acharya JN, Acharya VJ. Epilepsy in the elderly: Special considerations and challenges. *Ann Indian Acad Neurol*. 2014 Mar;17(Suppl 1):S18-26.

முதியவர்கள்

sanofi

வயதானவர்களில் கால்-கை வலிப்பு





உலகளவில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் 100,000 பேருக்கு 240 பேர் வயதான நோயாளிகள் (≥65 ஆண்டுகள்)

வரை கால்-கை வலிப்பு நோயால் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.¹

இந்தியாவில் 1,000 முதியவர்களில் 12 பேர் வலிப்பு நோயால் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.²


மூளைக் காயங்கள் அல்லது பிற காரணிகளால் வயதானவர்களில் வலிப்புத்தாக்கங்கள் மிகவும் பொதுவானவை:¹



சூடுதலாக, சில காரணிகள் வயதானவர்களில் கால்-கை வலிப்பைப் பூண்டும், அவை:³

ஆல்கஹால் / போதைப்பொருள் துஷ்பிரயோகம் மற்றும் பழக்கத்தை கைவிடுதல்	அதிகப்படியான காங்பின் உட்கொள்ளல்	நீரிழப்பு மற்றும் எலக்ட்ரோலைட் ஏற்ற இறக்கம்	தூக்கமின்மை மற்றும் உட்டடச்சத்து குறைபாடுகள்	வைட்டமின் மற்றும் உட்டடச்சத்து குறைபாடுகள்
குறைந்த இருத்த சர்க்கரை அளவுகள்	மன அழுத்தம்	உடல்நலக்குறைவு (காய்ச்சலுடன் / காய்ச்சல் இல்லாமல்)	ஓனிரும் பிரகாசமான விளக்குகள்	கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரக பிரச்சினைகள்

வயதானவர்களில் கால்-கை வலிப்பின் பின்வரும் அறிகுறிகளை நீங்கள் கவனிக்கலாம்⁴



உங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு வயதான உறுப்பினர் வலிப்புத்தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டால், நீங்கள் பின்வரும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்கலாம்:^{5,6}

குளிக்கும் போது கதவை பூட்ட அனுமதிக்காதீர்கள். ஸ்லைடிங் கதவுகள் மற்றும் வெளிப்புற திறப்பு கதவுகள் இருக்க வேண்டும்.

ஷவர் நாற்காலியைப் பயன்படுத்த வும், யாராவது வீட்டில் இருக்கும் போது மட்டுமே குளிக்கவும்

கண்ணாடியால் செய்யப்பட்ட பொருட்களைத் தவிர்க்கவும்



அவர்கள் குளிப்பதற்கு பதிலாக ஷவரில் குளிக்கட்டும்

வீட்டின் கூர்மையான மூடைகளை மூடி வைக்கவும் (எ.கா., படிக்கை மூலைகள்)

அடிக்கடி கீழே விழும் குழநிலையில்லாவர்கள் பாதுகாப்பு தலைக்கவசம் அணியட்டும்